

«ОДОБРЕНО»

Фармакологическим комитетом  
Минздрава России

19 июля 2001 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
АФЛУБИН® (AFLUBIN®)  
Комплексный гомеопатический препарат**

Регистрационный номер:

*№ 013116/01*

Торговое название: Афлубин.

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

**Описание лекарственной формы:** прозрачный, бесцветный или желтоватого цвета раствор со слабым специфическим запахом и легким привкусом горечавки.

**Состав:** в 100 мл содержится Gentiana D1 1 мл, Aconitum D6 10 мл, Bryonia D6 10 мл, Ferrum phosphoricum D12 10 мл, Acidum sarcosolacticum D12 10 мл, этиловый спирт 43 % по весу.

**Показания к применению:** применяется в комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегчения симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной; при лечении воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

**Способ применения и дозы:**

Для обеспечения наибольшей эффективности Афлубин следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи.

Возраст	Доза (разовая)	Кратность приема	Способ применения
<b>1 - 2 день заболевания ОРЗ или гриппом</b>			
Взрослые и подростки	10 капель	От 3 до 8 раз в день (не более)	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети до 1 года	1 капля	От 3 до 8 раз в день (не более)	Внутрь, развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока. Давать за 30 минут до или через 1 час после кормления.
Дети до 12 лет	5 капель	От 3 до 8 раз в день (не более)	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

<b>Дальнейшее лечение клинических проявлений ОРЗ или гриппа</b>			
Взрослые и подростки	10 капель	3 раза в день. 5-10 дней	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети до 1 года	1 капля	3 раза в день. 5-10 дней	Внутрь, развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока. Давать за 30 минут до или через 1 час после кормления.
Дети до 12 лет	5 капель	3 раза в день. 5-10 дней	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
<b>Плановая профилактика обострения заболевания в начале холодного времени года или перед эпидемией гриппа</b>			
Взрослые и подростки	10 капель	2 раза в день. 3 недели	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети до 1 года	1 капля	2 раза в день. 3 недели	Внутрь, развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока. Давать за 30 минут до или через 1 час после кормления.
Дети до 12 лет	5 капель	2 раза в день. 3 недели	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
<b>Экстренная профилактика – проводится сразу же после контакта с заболевшим гриппом или ОРЗ или после сильного переохлаждения</b>			
Взрослые и подростки	10 капель	2 раза в день. 2 дня	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети до 1 года	1 капля	2 раза в день. 2 дня	Внутрь, развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока. Давать за 30 минут до или через 1 час после кормления.
Дети до 12 лет	5 капель	2 раза в день. 2 дня	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
<b>Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом</b>			
Взрослые и подростки	10 капель	3-8 раз в день в начале лечения (1-2 день), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети до 12 лет	5 капель	3-8 раз в день в начале лечения (1-2 день), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

**Побочное действие:** редко может возникнуть повышенное слюноотделение. При возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Предупреждение:** при беременности и лактации препарат применяется по назначению врача

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

**Передозировка:** случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Форма выпуска:** флаконы с капельным дозатором по 20, 50, 100 мл.

**Условия хранения:** хранить при температуре не выше 25° С в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте.

Хранить в местах, недоступных для детей.

*Поскольку Афлубин содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.*

**Срок хранения:**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.


**Условия отпуска из аптек:** отпускают без рецепта врача.

**Предприятие-производитель:**

«Рихард Биттнер АГ», А-9344, Вайтенсфельд, 183, Австрия.

**Московское представительство:**

«Хербс Трейдинг ГмбХ», 121099, Москва, Новинский бульвар д.3, строение 1,  
телефон 797-96-60, факс 797-96-61



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Афлубин®/ Aflubin®**

**капли гомеопатические**

Произведено: Рихард Биттнер АГ, Австрия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "06" июня 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Лекарственная форма:</b> капли для приема внутрь гомеопатические</p> <p><b>Организация, принимающая претензии потребителей</b> Московское представительство «Хербс Трейдинг ГмбХ» 123242, Москва, Новинский бульвар д.31, тел.: +7 (495)981-48-88, факс: +7 (495)981-48-01.</p>	<p><b>Лекарственная форма:</b> капли гомеопатические</p> <p><b>Организация, принимающая претензии потребителей</b> ООО «Биттнер Фарма» 127018, Москва, ул. Суцевский вал, д. 18, тел.: +7 (495)981-48-88, факс: +7 (495)981-48-01</p>

Представитель компании  
Рихард Биттнер АГ, Австрия  
(по доверенности)



Кулинченко Н.А.

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки  
<https://protabletky.ru/aflubin/>