

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АЛЛОХОЛ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Аллохол

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав

Активные вещества: желчь сгущенная в пересчете на сухое вещество или желчь сухая – 80 мг; чеснок сушеный – 40 мг; крапивы листья – 5 мг; уголь активированный – 25 мг.

Вспомогательные вещества: в составе ядра: магния окись (магния оксид), крахмал картофельный, пласдон S 630 (кополивидон), полипласдон XL-10 (кросповидон), тальк, аэросил (кремния диоксид коллоидный), кальция стеарат, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600±2700 (повидон), в составе оболочки: сахар песок рафинированный (сахароза), магния карбонат основной, аэросил (кремния диоксид коллоидный), желатин, титана диоксид, поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600±2700 (повидон), тальк, тропеолин 0, воск пчелиный, масло вазелиновое медицинское.

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, с характерным запахом. На поперечном разрезе видны два слоя оболочки.

Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТХ: A05AX

Фармакологические свойства

Комбинированное средство, усиливающее образование желчи и желчных кислот.

Действие желчи сгущенной обусловлено рефлекторным влиянием на секреторную функцию паренхимы печени. Желчь сгущенная усиливает также секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта.

Вещества, содержащиеся в чесноке, усиливают секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта, стимулируют секрецию желчи.

Листья крапивы обладают желчегонными и противовоспалительными свойствами.

Уголь активированный является адсорбентом, связывающим токсические вещества в желудочно-кишечном тракте.

Показания к применению

Хронический реактивный гепатит, холангит, бескаменный холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, атонические запоры, постхолецистэктомический синдром.

Противопоказания

Гиперчувствительность, обтурационная желтуха, калькулезный холецистит, острый гепатит, острый панкреатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; детский возраст (до 3 лет – для таблеток).

Способы применения и дозы

Внутрь, после еды. Взрослые – по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 3-4 недели. При обострении заболевания принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки в течение 1-2 месяцев. Повторные курсы лечения проводят с интервалом 3 месяца. Перед применением препарата у детей следует проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диарея. При их появлении необходимо прекратить употребление препарата и обратиться к врачу.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 10 или 24 таблетки в контурные ячейковые упаковки; 1, 2, 3, 4 или 5 контурных упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона; 180, 300 контурных упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона.

Срок годности

3 года. Препарат следует использовать до даты, указанной на упаковке

Условия хранения

В сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.


Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и адрес изготовителя


ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»
ул. Б. Каменщики, д. 9, г. Москва, 115172
Тел/факс (495) 912-71-61

И.о. директора ИДКЭЛС



С.В. Буданов

Зам. генерального директора
ОАО «Мосхимфармпрепараты»
им. Н. А. Семашко»



Н. Н. Чадова

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки
<https://protabletky.ru/allochol/>