

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
Аскорутин**

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Аскорутин

Группировочное название: Аскорбиновая кислота + Рутозид

Лекарственная форма: таблетки 50 мг + 50 мг

Состав на одну таблетку:

активные вещества: аскорбиновая кислота 50 мг, рутозид (рутин) 50 мг.

вспомогательные вещества: сахароза (сахар) 120,6 мг, целлюлоза микрокристаллическая 76,3 мг, крахмал картофельный 26,9 мг, кальция стеарат 3,1 мг, тальк 3,1 мг.

Описание: таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с незначительными вкраплениями, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: витамин.

Код АТХ: [C05CA51].

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свёртываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению сопротивляемости организма. Рутин устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшая её отёчность и воспаление. Обладает антиагрегантным действием, что способствует улучшению микроциркуляции.

Показания к применению

Гиповитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст.

С осторожностью

Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам, тромбофлебит.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 2 – 3 раза в сутки во время или после приёма пищи. Курс лечения 2 – 3 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), диспепсические расстройства, головная боль.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов проявляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Не оказывает влияния на способность к управлению автомобилем, работу с точными и потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска

Таблетки 50 мг + 50 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. По 5 контурных ячейковых упаковок с инструкцией по применению в пачку из картона. По 30 или 50 таблеток в банки полимерные. Банку с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта врача.

Производитель:

ООО «РОЗФАРМ»

171261, Россия, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, 1.

Тел./факс: (48242) 58-189.

Генеральный директор
ООО «РОЗФАРМ»



Бабский М.В.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА
Аскорутин таблетки

Регистрационный номер: Р N000705/01 от 29.12.2006

Изменение № 1

Срок введения изменений с "18" 09 2008 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав: Активные вещества: Аскорбиновая кислота - 50 мг, Рутозид (рутин) - 50 мг. Вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный, кальция стеарат, тальк.</p>	<p>Состав: Активные вещества: Аскорбиновая кислота - 50 мг, Рутозид (рутин) - 50 мг. Вспомогательные вещества: сахароза (сахар), крахмал картофельный, кальция стеарат, тальк.</p>


Исполнительный директор
ООО «РОЗФАРМ»



СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора ИДКЭЛС

Моисеенко И.М. Моисеенко

«06» 02 2008 г.



Н. Васильев
2008 г.

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки

<https://protabletky.ru/ascorutin/>