

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КАНДИД

Регистрационный номер: №

Торговое название препарата: Кандид

Международное непатентованное название: клотrimазол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения

Состав:

Каждый грамм препарата содержит:

Активное вещество: клотrimазол 10,0 мг

вспомогательные вещества: пропиленгликоль,

Описание: прозрачная, бесцветная вязкая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Код АТХ: [D01AC01].

Фармакологическое действие.

Кандид является противогрибковым средством широкого спектра действия для местного применения. Антимикотический эффект активного действующего вещества клотrimазола (производное имидазола) связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембранны грибов, что изменяет проницаемость мембранны и вызывает последующий лизис клетки. В малых концентрациях действует фунгистатически, а в больших – фунгицидно, причем не только на пролиферирующие клетки. В фунгицидных концентрациях взаимодействует с митохондриальными и пероксидазными ферментами, в результате чего происходит увеличение концентрации перекиси водорода до токсического уровня, что также способствует разрушению грибковых клеток.

Эффективен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов, а также возбудителя разноцветного лишая *Pityriasis versicolor* (*Malazessia furfur*) и возбудителя эритразмы. Оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных бактерий (*Bacteroides*, *Gardnerella vaginalis*), а также в отношении *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика

Клотримазол плохо всасывается через кожу и слизистые оболочки и практически не оказывает системного действия.

При наружном применении концентрация клотримазола в эпидермисе выше, чем в дерме и подкожной клетчатке.

Показания к применению

- грибковые заболевания кожи, микозы кожных складок, стоп;
- отрубевидный лишай, эритразма, поверхностные кандидозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми (включая род Candida), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу;
- микозы, осложненные вторичной пиодермией.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к клотримазолу или вспомогательным веществам (пропиленгликолю, полиэтиленгликолю, изопропиловому спирту);
- I триместр беременности.

С осторожностью – период лактации.

Применение во время беременности и в период кормления грудью

При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение препарата в период беременности или в период кормления грудью оказывает отрицательное влияние на здоровье женщины или плода (ребенка). Однако вопрос о целесообразности назначения препарата должен решаться индивидуально после консультации врача.

Нанесение препарата непосредственно на лактирующую грудную железу противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Раствор наносят 2 раза в день на предварительно очищенные (с применением мыла с нейтральным значением рН) и сухие пораженные участки кожи.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, локализации патологических изменений и эффективности терапии.

Лечение дерматомикозов проводят не менее 4 недель, отрубевидного лишая - 1-3 недель.

При грибковых заболеваниях кожи ног терапию рекомендуется продолжить еще в течение не менее 2 недель после устранения симптомов заболевания.

Побочное действие

Зуд, жжение, покалывания в местах нанесения, появление эритемы, волдырей, отека, раздражения и шелушения кожи. Аллергические реакции (зуд, крапивница).

Передозировка

Применение раствора в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний, опасных для жизни.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Амфотерицин В, нистатин, натамицин снижают эффективность клотrimазола при одновременном применении.

При применении раствора отрицательные взаимодействия с другими средствами не известны и их не следует ожидать, т.к. резорбционная способность клотrimазола очень низкая.

Особые указания

Не рекомендуется нанесение препарата на кожу в области глаз.

При появление признаков гиперчувствительности или раздражения лечение прекращают.

При отсутствии эффекта в течение 4 недель следует подтвердить диагноз.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения 1%.

По 20 мл препарата во флаконы полиэтиленовые. 1 флакон с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности!

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель:

"Гленмарк Фармасьютикалз Лтд." Индия

Представительство фирмы:

119049, Москва, Калужская площадь, д.1, офис 271.

тел./факс (095) 775-24008

Директор ИДКЭЛС, проф.

В.В. Чельцов

Представитель фирмы

Е.Ю. Писковцева

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки

<https://protabletky.ru/candid/>