

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**КАРБОПЕКТ®****Регистрационный номер:****Торговое название препарата:** Карбопект®**МНН или группировочное название:** Активированный уголь &**Лекарственная форма:** таблетки**Состав на 1 таблетку:**

<i>активное вещество:</i>	уголь активированный - 0,23 г;
<i>вспомогательные вещества:</i>	пектин 0,048 г; целлюлоза микрокристаллическая 0,049 г; кальция стеарат 0,003 г.

**Описание:** таблетки плоскоцилиндрической формы черного цвета, с блестящими вкраплениями и вкраплениями серовато-бежевого цвета, с шероховатой поверхностью и риской. Допускается неоднородность окрашивания поверхности таблеток - наличие вкраплений, величина и количество которых может отличаться на верхней и нижней стороне таблетки.

**Фармакотерапевтическая группа:** энтеросорбирующее средство**Код АТХ:** [A07BA01]**Фармакологическое действие**

Оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие.

**Фармакодинамика**

Относится к группе поливалентных физико-химических антидотов, обладает большой поверхностной активностью. Адсорбирует яды и токсины из желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) до их всасывания, в том числе алкалоиды, гликозиды, барбитураты и др. снотворные и наркотические средства, соли тяжелых металлов, токсины бактериального, растительного, животного происхождения, производные фенола, синильной кислоты, сульфаниламиды, газы. Препарат адсорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ — билирубина, мочевины, холестерина, а также эндогенные метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Слабо адсорбирует кислоты и щелочи (в т.ч. соли железа, цианиды, мелатион, метанол, этиленгликоль). Не вызывает снижения двигательной активности кишечника (пектин).

**Фармакокинетика**

Не всасывается, не расщепляется, выделяется полностью через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) в течение 24 часов.

**Показания для применения**

В качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения: пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия, комплексном лечении.

Отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и другими), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами.

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сопровождающиеся диспепсией, метеоризмом.

Пищевая и лекарственная аллергия.

Гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (почечная недостаточность).

Для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуком и рентгенологическим исследованием.

С целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

**Противопоказания для применения**

- язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (в т.ч. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит),
- кровотечения из ЖКТ,
- атония кишечника,
- индивидуальная непереносимость препарата.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применять по назначению врача

**Режим дозирования, способ введения**

Внутрь в таблетках или, после предварительного измельчения, в виде водной взвеси, за 1-2 ч до или после еды и приема других лекарств. Необходимое количество препарата размешивают в  $\frac{1}{2}$  стакана воды.

Режим дозирования взрослым в среднем по 0,9-1,8 г (4-8 таблеток) 3-4 раза в сутки, максимальная разовая доза для взрослых до 8,0 г.

Детям препарат назначают в среднем из расчета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки, максимальная разовая доза до 0,2 г/кг массы тела.

При острых отравлениях лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси «Карбопекта», затем дают внутрь 20-30 г препарата.

Курс лечения при острых заболеваниях 3-5 дней. При аллергии и хронических заболеваниях – до 14 дней. Повторный курс – через 2 недели по рекомендации врача.

При метеоризме назначают внутрь по 0,9-1,8 г (4-8 таблеток) препарата 3-4 раза в день.

Курс лечения 3-7 дней.

### **Побочное действие**

Диспепсия. При длительном применении снижение всасывания витаминов, кальция и других питательных веществ из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Окрашивание каловых масс в темный цвет.

### **Передозировка**

Данных о передозировке препарата не зарегистрировано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Таблетки «Карбопект» снижают эффективность одновременно принимаемых лекарственных препаратов, в т.ч. антитоксических лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (метионин и др.) Уменьшает эффективность лекарственных средств, действующих на слизистую оболочку желудочно – кишечного тракта ( в т.ч. ипекакуаны и термопсиса).

### **Особые указания**

При лечении интоксикации необходимо создать избыток угля активированного в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля активированного в среде способствует десорбции связанного вещества в просвет кишечника и его всасыванию в кровь; для предупреждения резорбции рекомендуется повторное промывание желудка с углем активированным и назначение угля активированного внутрь. Если отравление вызвано веществами, участвующими в enteroгепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять уголь активированный в течение нескольких дней. При использовании препаратов более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция.

Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность.

**Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, работа с движущимися механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к занятию потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **Форма выпуска**

Таблетки 230 мг.

По 10 таблеток в контурной ячейковой или безъячейковой упаковке. По 20, 50, 100, 120 таблеток в банках полимерных.

1, 2, 5, 10, 12 контурных ячейковых или безъячейковых упаковок, каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Срок годности**

3 года. По истечении срока годности препарат не должен применяться.

### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

**Хранить в недоступном для детей месте**

### **Условия отпуска**

Отпуск без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:**



ЗАО «МЕДИСОРБ»

614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

телефон/факс (342) 283-65-31, (342) 250-19-37

E-mail: medisorb@permonline.ru. Internet: www.medisorb.ru

Директор по науке ЗАО «Медисорб»,  
докт. фарм. наук, профессор



*Г.П. Вдовина*  
Г.П. Вдовина

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки  
<https://protabletky.ru/carbopect/>