

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КАРБОПЕКТ

Регистрационный номер ЛС-000397

Торговое название препарата Карбопект.

Описание

Капсулы желатиновые бесцветные № 0, содержащие гранулы чёрного цвета. У гранул допускается наличие блестящих вкраплений.

Лекарственная форма Капсулы.

Состав

Активное вещество.

Уголь активированный

0,11 г

Вспомогательные вещества:

пектин, микрокристаллическая целлюлоза

Капсулы твердые желатиновые

Фармакотерапевтическая группа Энтеросорбирующее средство.

Код АТХ [A07BA01]

Фармакологическое действие

Комбинированный энтеросорбент широкого спектра действия, оказывающий энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие. Относится к группе поливалентных физико-химических антидотов, обладает большой поверхностной активностью. Адсорбирует яды и токсины из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) до их всасывания, в том числе алкалоиды, гликозиды, барбитураты и др. снотворные и наркотические средства, соли тяжелых металлов, токсины бактериального, растительного, животного происхождения, производные фенола, синильной кислоты, сульфаниламиды, газы. Препарат адсорбирует также избыток некоторых продуктов обмена веществ – билирубина, мочевины, холестерина, а также эндогенные метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Слабо адсорбирует кислоты и щелочи (в т.ч. соли железа, цианиды, мелатион, метанол, этиленгликоль). Не вызывает снижения двигательной активности кишечника (пектин).

Фармакокинетика

Не всасывается, не расщепляется, выделяется полностью через ЖКТ в течение 24 часов.

Показания к применению

В качестве детоксицирующего средства при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения: пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия, в комплексном лечении.

Отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и другими), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами.

Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся диспепсией, метеоризмом.

Пищевая и лекарственная аллергия.


Гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (почечная недостаточность).

Для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуком и рентгенологическим исследованием.

С целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

Противопоказания

Язвенные поражения ЖКТ (в т.ч. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит), кровотечения из ЖКТ, атония кишечника, индивидуальная непереносимость препарата.



Способы применения и дозы

Внутри за 1-2 ч до или после еды и приема других лекарств.

Режим дозирования взрослым в среднем по 4-8 капсул 3-4 раза в сутки, максимальная разовая доза для взрослых до 32 капсул.

Детям препарат назначают в среднем из расчета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки, максимальная разовая доза до 0,2 г/кг массы тела.

Детям до 6 лет капсулы необходимо раскрыть, высыпать содержимое капсулы в воду и применять в виде взвеси.

Курс лечения при острых заболеваниях 3-5 дней. При аллергии и хронических заболеваниях – до 14 дней. Повторный курс – через 2 недели по рекомендации врача.

При метеоризме назначают внутрь по 4-8 капсул 3-4 раза в день. Курс лечения 3-7 дней.

Побочное действие

Диспепсия. При длительном применении снижение всасывания витаминов, кальция и других питательных веществ из ЖКТ. Окрашивание каловых масс в темный цвет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Капсулы Карбопект снижают эффективность лекарственных препаратов, применяемых внутрь одновременно с ним.

Особые указания

При лечении интоксикации необходимо создать избыток угля активированного в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля активированного в среде способствует десорбции связанного вещества в просвет кишечника и его всасыванию в кровь; для предупреждения резорбции рекомендуется повторное промывание желудка с углем активированным и назначение угля активированного внутрь. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять уголь активированный в течение нескольких дней. При использовании препаратов более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция.

Форма выпуска

Капсулы.

По 20; 50; 100; 120 или 150 капсул во флаконы или в банки полимерные.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке.

2; 5; 10 или 15 контурных ячейковых упаковок, или каждый флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, не доступных для детей.

Срок годности

3 года. По истечении срока годности препарат не должен применяться.

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «МЕДИСОРБ»

614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

телефон (342) 2586-128, 2586-256; факс (342) 2551-031

электронная почта: medisorb@permonline.ru. Internet: www.medisorb.perm.ru

Директор ИДКЭПО
профессор

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки

С.В. Буданов

<https://protabletky.ru/carbopect/>

Директор по науке ЗАО «МЕДИСОРБ»,
профессор

Г.П. Вдовина