МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 002180-150813
СОГЛАСОВАНО

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ

## по применению лекарственного препарата для медицинского применения

## ФУРАЦИЛИН

**Номер регистрационного удостоверения:**

**Торговое наименование:** Фурацилин

**Международное непатентованное наименование:** Нитрофурал

**Лекарственная форма:** раствор для наружного применения [спиртовой]

**Состав.**

*Действующее вещество*:

Нитрофурал (фурацилин) – 0,067 г

*Вспомогательное вещество*:

Этанол (этиловый спирт) 70 % – до 100 мл

**Описание:** прозрачная жидкость желтого цвета со спиртовым запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство - нитрофуран

**Код АТХ:** [D08AF01]

**Фармакологическое действие**

Противомикробное средство. Обладает отличным от других химиотерапевтических средств механизмом действия: микробные флавопротеины, восстанавливая 5-нитрогруппу, образуют высокореактивные аминопроизводные, способные вызывать конформационные изменения белков (в т. ч. рибосомальных) и др. макромолекул, приводя к гибели клеток. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli., Clostridium perfringens). Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени. Увеличивает активность ретикулоэндотелиальной системы (РЭС), усиливает фагоцитоз.

**Фармакокинетика**

При местном и наружном применении всасывание незначительное.

**Показания к применению**

Гнойные раны, пролежни, мелкие повреждения кожи (в т. ч. ссадины, царапины, трещины, порезы), острый наружный и средний отит.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, нарушение целостности (пер-

форация) барабанной перепонки, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

**Способ применения и дозы**

Наружно: орошают раны и накладывают влажные повязки.

Местно: при отитах спиртовой раствор, нагретый до температуры тела, ежедневно закапывают по 1-2 капли 2-3 раза в день или вводят на турундах в слуховой проход.

Продолжительность лечения 3-5 дней.

**Побочное действие**

Аллергические реакции, дерматит.

**Передозировка**

При передозировке возможно усиление побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Нет данных.

**Особые указания**

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска**

Раствор для наружного применения [спиртовой] 0,067 %.

По 10, 25, 50, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

По 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена, укупоренные пробками-капельницами, или дозаторами, или наконечниками полимерными и крышками полимерными.

По 10, 25, 50, 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается укладка флаконов в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению (для стационаров).

По 4,5 л в бутыли из полиэтилентерефталата (для стационаров).

Бутыли помещают в групповую упаковку из картона с равным количеством инструкций по применению.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел/факс: (4872) 41-04-73

Директор ООО “Тульская фармацевтическая фабрика” Л.Я. Рабинович

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки
https://protabletky.ru/furacilin/