

Показания к применению

Острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатическая болезнь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата, беременность (I триместр).

С осторожностью применять Лазолван в период II-III триместров беременности и лактации, при почечной и печеночной недостаточности.

Беременность и период лактации

При необходимости применения Лазолвана во II-III триместрах беременности следует оценить потенциальную пользу терапии для матери и возможный риск для плода. Лазолван проникает в грудное молоко, однако, назначаемый в терапевтических дозах, он не оказывает отрицательного воздействия на ребенка.

Способ применения и дозы

Прием внутрь

(1 мл = 25 капель).

Взрослым: в начале лечения по 4 мл 3 раза в день;

Детям старше 6 лет: 2 мл (=50 капель) 2-3 раза в день;

Детям от 2 до 6 лет: 1 мл (=25 капель) 3 раза в день;

Детям до 2 лет: 1 мл (=25 капель) 2 раза в день.

Капли добавляют в чай, фруктовый сок, молоко или воду и принимают во время еды.

Ингаляции

Взрослым и детям старше 6 лет: 1-2 ингаляции по 2-3 мл раствора ежедневно.

Детям до 6 лет: 1-2 ингаляции по 2 мл раствора ежедневно.

Ингаляционный раствор Лазолван можно применять, используя любое современное оборудование для ингаляций (кроме паровых ингаляторов). Препарат смешивается с физиологическим раствором, для достижения оптимального увлажнения воздуха, в респираторе препарат можно развести в соотношении 1:1. Поскольку при ингаляционной терапии глубокий вдох может спровоцировать кашлевые толчки, ингаляции следует проводить в режиме обычного дыхания. Перед ингаляцией обычно рекомендуется подогреть ингаляционный раствор до температуры тела. Больным с бронхиальной астмой можно рекомендовать проводить ингаляцию после приема бронхолитических препаратов.

Побочное действие

Лазолван, как правило, хорошо переносится.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь. Крайне редко сообщалось о случаях острых тяжелых реакций анафилактического типа (анафилактический шок).

Со стороны желудочно-кишечного тракта описаны слабо выраженные изжога, гастралгия, диарея, в редких случаях - тошнота, рвота.

Передозировка

Случаи передозировки у человека не известны.
Возможные симптомы: тошнота, рвота, гастралгия.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксицилина.

Взаимодействия с другими препаратами не описаны.

Особые указания

Лазолван раствор содержит бензалкония хлорид. У больных с наличием гиперактивности дыхательных путей этот консервант может вызвать спазм бронхов во время ингаляции.

Форма выпуска:

По 100 мл во флаконе янтарного стекла с навинчиваемой крышкой.
Каждый флакон с мерной мензуркой и инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.
Не допускать замораживания.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.


Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

Берингер Ингельхайм Италия С.п.А., Италия
Флоренция, 50066 Реджелло
Представительство в Москве:
119049 Москва, ул. Донская, 29/9, стр.1, тел. (095) 411 78 01

Директор ИДКЭЛС



В.В.Чельцов

Представитель фирмы



Ю.Е.Яблокова

Показания к применению

Острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатическая болезнь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата, беременность (I триместр).

С осторожностью применять Лазолван в период II-III триместров беременности и лактации, при почечной и печеночной недостаточности.

Беременность и период лактации

При необходимости применения Лазолвана во II-III триместрах беременности следует оценить потенциальную пользу терапии для матери и возможный риск для плода. Лазолван проникает в грудное молоко, однако, назначаемый в терапевтических дозах, он не оказывает отрицательного воздействия на ребенка.

Способ применения и дозы

Прием внутрь

(1 мл = 25 капель).

Взрослым: в начале лечения по 4 мл 3 раза в день;

Детям старше 6 лет: 2 мл (=50 капель) 2-3 раза в день;

Детям от 2 до 6 лет: 1 мл (=25 капель) 3 раза в день;

Детям до 2 лет: 1 мл (=25 капель) 2 раза в день.

Капли добавляют в чай, фруктовый сок, молоко или воду и принимают во время еды.

Ингаляции

Взрослым и детям старше 6 лет: 1-2 ингаляции по 2-3 мл раствора ежедневно.

Детям до 6 лет: 1-2 ингаляции по 2 мл раствора ежедневно.

Ингаляционный раствор Лазолван можно применять, используя любое современное оборудование для ингаляций (кроме паровых ингаляторов). Препарат смешивается с физиологическим раствором, его можно развести в соотношении 1:1 для достижения оптимального увлажнения воздуха в респираторе. Поскольку при ингаляционной терапии глубокий вдох может спровоцировать кашлевые толчки, ингаляции следует проводить в режиме обычного дыхания. Перед ингаляцией обычно рекомендуется подогреть ингаляционный раствор до температуры тела. Больным с бронхиальной астмой можно рекомендовать проводить ингаляцию после приема бронхолитических препаратов.

Побочное действие

Лазолван, как правило, хорошо переносится.

Аллергические реакции: редко - кожная сыпь. Крайне редко сообщалось о случаях острых тяжелых реакций анафилактического типа (анафилактический шок).

Со стороны желудочно-кишечного тракта описаны слабо выраженные изжога, гастралгия, диарея, в редких случаях - тошнота, рвота.

Передозировка

Случаи передозировки у человека не известны.

Возможные симптомы: тошнота, рвота, гастралгия.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина.

Взаимодействия с другими препаратами не описаны.

Особые указания

Лазолван раствор содержит бензалкония хлорид. У больных с наличием гиперактивности дыхательных путей этот консервант может вызвать спазм бронхов во время ингаляции.

Форма выпуска:

По 100 мл во флаконе янтарного стекла с навинчиваемой крышкой.

Каждый флакон с мерной мензуркой и инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Не допускать замораживания.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия,


произведено Институт де Ангели С.Р.Л., Италия

50066 Реггелло, Прулли, 103/С, Флоренция, Италия

50066 Reggello, Loc. Prulli, 103/C, Firenze, Italy

Представительство в Москве: 119049 Москва, ул. Донская 29/9, стр.1,
тел. (095) 411 78 01; факс: (095) 411 78 02

Директор ИДКЭЛО



Чельцов В.В.

Представитель фирмы

«Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ» в РФ



Яблокова Ю.В.

**Инструкция по медицинскому применению
препарата Лазолван[®]**

Регистрационный номер:

Торговое название: Лазолван[®]

Международное непатентованное название: амброксол

Лекарственная форма:

раствор для приема внутрь и ингаляций

Состав

1 мл раствора содержит:

активное вещество:

амброксола гидрохлорид 7,5 мг

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода очищенная

Описание

Прозрачный, бесцветный или слегка коричневатый раствор

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее, муколитическое средство

Код АТХ: R05CB06

Фармакологическое действие

Амброксол обладает секретомоторным, секретолитическим и отхаркивающим действием; стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, усиливает продукцию легочного сурфактанта и стимулирует цилиарную активность; нормализует нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. Активируя гидролизующие ферменты и усиливая высвобождение лизосом из клеток Клара, снижает вязкость мокроты; усиливает ток и транспорт слизи (мукоцилиарный клиренс). Усиление мукоцилиарного клиренса улучшает отхождение мокроты и облегчает кашель.

Фармакокинетика

Для амброксола характерна быстрая и почти полная абсорбция с линейной зависимостью от дозы в терапевтическом интервале концентраций. Максимальное содержание в плазме при пероральном приеме достигается через 0,5 – 3 часа. В терапевтическом интервале концентраций связывание с белками плазмы составляет примерно 90%.

Переход амброксола из крови в ткани при пероральном применении происходит быстро. Самые высокие концентрации активного компонента препарата наблюдаются в легких.

Примерно 30% введенной пероральной дозы подвергается эффекту первичного прохождения через печень. Исследования на микросомах печени человека

показали, что СУРЗА4 является преобладающей изоформой, ответственной за метаболизм амброксола. Оставшаяся часть амброксола метаболизируется в печени, главным образом, путем конъюгации. Терминальный период полувыведения амброксола составляет 10 часов. Общий клиренс находится в пределах 660 мл/мин, на почечный клиренс приходится примерно 8% от общего клиренса.

Не обнаружено клинически значимого влияния возраста и пола на фармакокинетику амброксола, поэтому нет оснований для коррекции дозы по этим признакам.

Показания к применению

Острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктатическая болезнь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата, беременность (I триместр).

С осторожностью применять Лазолван® в период беременности (II – III триместр) и лактации, при почечной и/или печеночной недостаточности.

Беременность и период лактации

Амброксол проникает через плацентарный барьер. Эксперименты на животных не выявили прямого или косвенного неблагоприятного влияния на беременность, эмбриональное, пренатальное и постнатальное развитие и на роды.

В I триместре противопоказано применение, во II и III триместре беременности – с осторожностью. Всесторонние клинические исследования в III триместре беременности не обнаружили свидетельств отрицательного влияния препарата на плод.

Амброксол может экскретироваться с женским молоком. Однако неблагоприятный эффект у новорожденных маловероятен. При необходимости применения Лазолван® кормящими матерями следует соблюдать осторожность.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Прием внутрь

(1 мл = 25 капель).

Взрослым: в начале лечения по 4 мл 3 раза в день;

Детям старше 6 лет: 2 мл (= 50 капель) 2-3 раза в день;

Детям от 2 до 6 лет: 1 мл (= 25 капель) 3 раза в день;

Детям до 2 лет: 1 мл (= 25 капель) 2 раза в день.

Раствор следует принимать с пищей, чаем, фруктовым соком, молоком или водой во время еды.

Ингаляции

Взрослым и детям старше 6 лет: 1-2 ингаляции по 2-3 мл раствора в день.
Детям до 6 лет: 1-2 ингаляции по 2 мл раствора в день.

Лазолван[®], раствор для ингаляций можно применять, используя любое современное оборудование для ингаляций (кроме паровых ингаляторов). Для достижения максимального увлажнения при ингаляциях препарат смешивают с 0,9 % раствором натрия хлорида в соотношении 1:1. Поскольку при ингаляционной терапии глубокий вдох может спровоцировать кашель, ингаляции следует проводить в режиме обычного дыхания. Перед ингаляцией обычно рекомендуется подогреть ингаляционный раствор до температуры тела. Больным с бронхиальной астмой рекомендуется проводить ингаляцию после приема бронхолитических препаратов, во избежание неспецифического раздражения дыхательных путей и их спазма.

Прием препарата более 4-5 дней возможен только по рекомендации врача.

Побочное действие

Желудочно-кишечные расстройства:

Изжога, диспепсия, тошнота, рвота, диарея, боли в верхней части живота, снижение чувствительности в полости рта или пищевода, сухость во рту и в горле.

Расстройства иммунной системы, кожи и подкожных тканей:

Аллергические реакции (включая анафилактический шок), ангионевротический отек, кожная сыпь (экзантема), крапивница, зуд и другие аллергические реакции (например, аллергический дерматит).

Расстройства нервной системы:

Дисгевзия (нарушение вкусовых ощущений)

Передозировка

Симптомы передозировки: тошнота, рвота, диарея, диспепсия.

Лечение: искусственная рвота, промывание желудка в первые 1 - 2 час после приема препарата; прием жиросодержащих продуктов, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина.

Особые указания

Не следует комбинировать с противокашлевыми средствами, затрудняющими выведение мокроты.

Раствор содержит консервант бензалкония хлорид, который при ингаляции может вызвать сокращение бронхов у чувствительных пациентов с повышенной реактивностью дыхательных путей.

55190

У пациентов с тяжелыми поражениями кожи - синдромом Стивенса-Джонсона или синдрома Лайелла - в ранней фазе могут появляться температура, боль в теле, ринит, кашель и воспаление горла. При симптоматическом лечении возможно ошибочное назначение муколитических средств, таких как амброксола гидрохлорид. Имеются единичные сообщения о выявлении синдрома Стивенса-Джонсона и синдрома Лайелла, совпавшие по времени с назначением препарата; однако причинно-следственная связь с приемом препарата отсутствует.

При развитии вышеперечисленных синдромов рекомендуется прекратить лечение и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл.

По 100 мл во флаконы янтарного стекла с капельницей из полиэтилена и навинчиваемой крышкой из полипропилена с контролем первого вскрытия. Каждый флакон помещают в картонную пачку с инструкцией по применению и мерным стаканчиком.

Условия хранения

Список Б.

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель:


Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмБХ, Германия,
произведено Институт де Ангели С.Р.Л., Италия
50066 Реггелло, Прулли, 103/С, Флоренция, Италия


Представительство в Москве:


119049 Москва, ул. Донская, 29/9, стр.1,

Тел.: (495) 411-78-01, факс: (495) 411-78-02

Представитель фирмы
Менеджер по регистрации


И.В. Григорян





Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки
<https://protabletky.ru/lasolvan/>

55 190