

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  
ЛИНЕКС® / LINEX®**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР****ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА**

Линекс®

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА**

капсулы

**СОСТАВ**

1 капсула содержит:

*активный компонент* - Лебенин® порошок 280,00 мг (в 1 г порошка содержится:

Lactobacillus acidophilus -300 мг, Bifidobacterium infantis - 300 мг, Enterococcus faecium - 300 мг, вспомогательные вещества – лактоза, крахмал картофельный)

*вспомогательные вещества*: магния стеарат; оболочка капсулы – метилгидроксibenзоат, пропилгидроксibenзоат, титана диоксид (E171), желатин.**ОПИСАНИЕ**

Непрозрачные капсулы, белый корпус – былая крышечка. Содержимое – белый порошок без запаха.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА**

Эубиотик.

Код АТХ: А07FA51


**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Линекс® нормализует микрофлору кишечника.

Одна капсула препарата Линекс® содержит не менее  $1,2 \times 10^7$  живых лиофилизированных молочнокислых бактерий: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium. Живые молочнокислые бактерии являются нормальной составляющей естественной микрофлоры кишечника и содержатся уже в пищеварительном тракте новорожденного ребенка.

Эти бактерии имеют большое биохимическое значение для человеческого организма:

- брожение лактозы сдвигает рН фактор в кислую сторону. Кислотная окружающая среда угнетает рост патогенных и условно патогенных бактерий и обеспечивает оптимальное действие пищеварительных ферментов;
- участвуют в синтезе витаминов группы В, К, аскорбиновой кислоты, повышая тем самым резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды;
- участвуют в метаболизме желчных пигментов и желчных кислот;
- синтезируют вещества с антибактериальной активностью;
- повышает иммунную реактивность организма.



**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- Лечение и профилактика дисбактериозов.

Дисбактериоз проявляется следующими симптомами: диарея (понос), диспепсия (нарушение пищеварения), запоры, метеоризм (вздутие живота), тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе, возможны аллергические кожные реакции.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Гиперчувствительность к компонентам препарата или молочным продуктам.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ**

Применение препарата Линекс® при беременности и в период лактации считается безопасным.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Внутрь.

Линекс® следует принимать после еды, запивая небольшим количеством жидкости.

Детям до 3-х лет и пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее необходимо вскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости.

**Новорожденные и дети до 2-х лет:** по 1 капсуле 3 раза в день;

**Дети от 2 до 12 лет:** по 1-2 капсулы 3 раза в день

**Взрослые и подростки старше 12 лет:** по 2 капсулы 3 раза в день.

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Препарат хорошо переносится. Сообщений о нежелательных эффектах нет, однако нельзя исключить возможность возникновения реакций гиперчувствительности.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Данных о симптомах передозировки нет.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными средствами не отмечено.

Состав препарата позволяет принимать Линекс® одновременно с другими лекарственными средствами, включая антибиотики и химиотерапевтические препараты.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

*Не следует запивать Линекс® горячими напитками и принимать одновременно с алкоголем.*

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом препарата, если у Вас:

- температура тела выше 38° С,
- следы крови или слизи в стуле,
- диарея длится более двух дней и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей веса,
- хронические заболевания – сахарный диабет, СПИД.



При лечении диареи необходимо возмещение потерянной жидкости и электролитов.

**Влияние на способности к концентрации внимания:** Линекс® не оказывает влияния на психофизическую активность.

#### ФОРМА ВЫПУСКА

По 16 капсул в блистере из мягкой алюминиевой фольги /жесткой полимерной пленки (AL/PVC/PVDC); по 8 капсул в блистере из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al ); по 16 или 32 капсулы во флаконе темного стекла.

По 1 блистеру из мягкой алюминиевой фольги /жесткой полимерной пленки (AL/PVC/PVDC), по 2 или 4 блистера из мягкой алюминиевой/жесткой алюминиевой фольги (Al/Al ) или по 1 флакону в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Блистеры из алюминиевой фольги: при температуре не выше 25°C;

Блистеры из алюминиевой фольги/полимерной пленки и флаконы: в сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Флакон хранить плотно закрытым. После первого вскрытия флакона использовать препарат в течение 4 месяцев.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

#### УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Лек д.д.

Веровшкова 57, Любляна, Словения

*Претензии потребителей направлять в Представительство в РФ:*

119002, Москва, Староконюшенный пер., 10/10, стр.1

тел.: 258-8484 факс: 258-8485

И.о.директора ИДКЭЛС



С.В.Буданов

Представитель компании



Е.Ю.Барманова

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки

<https://protabletky.ru/linex/>