ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МУКАЛТИН

Регистрационный номер:

Торговое название
МУКАЛТИН

Лекарственная форма
Таблетки

Состав на 1 таблетку

Мукалтина	0,05 г
Вспомогательных веществ (натрия гидрокарбонат, кислота винная, кальция стеарат).	до получения таблетки массой 0,3 г

Описание
Таблетки от светло-серого до коричневато-серого цвета с вкраплениями или мраморностью, со специфическим запахом, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Допускается неоднородность окрашивания поверхности таблеток.

Фармакологическая группа
Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологические свойства:
Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

Показания к применению:
Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония и др.) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

ProTabletky.ru

Способ применения и дозы:
Внутрь по 1-2 таблетки перед едой 3 раза в сутки. Курс лечения в среднем 7-14 дней.
Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана теплой воды.

Побочные действия:
Аллергические реакции, редко - диспепсические явления.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.
Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Форма выпуска
Таблетки по 0,05 г;
по 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке;
по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке;
по 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 таблеток в банке полимерной.
Банки полимерные или контурные упаковки с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.
Каждую банку или 1, 2, 3, 4, 5 контурных безъячейковых или ячейковых упаковок с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения.
В сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 20 ^{0}C.

Срок годности
2 года
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
ОАО «Уралбиофарм» 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А
тел. (343) 224-17-63, факс (343) 224-17-60.

Директор ИДКЭЛС,
профессор Чельцов В.В.

Представитель фирмы Саакова М.Ю.

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки
https://protabletky.ru/mucaltin/