МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПАПАВЕРИН

Регистрационный номер:

Торговое название: Папаверин

Международное непатентованное название: папаверин

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий:

Активное вещество: папаверина гидрохлорид - 0,02 г.

Основа для суппозитория: парафин нефтяной твердый типа П-1 или П-2 – 0,105 г, жир твердый (витепсол W 35) – 1,125 г, масса суппозитория - 1,25 г.

Описание: Суппозитории от белого до белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа: спазмолитическое средство

Код АТХ: A03AD01

Фармакологические свойства

Снижает тонус гладких мышц и оказывает в связи с этим сосудорасширяющее и спазмолитическое действие.

Является ингибитором фермента фосфодиэстеразы и вызывает внутриклеточное накопление циклического 3',5'-аденозинмонофосфата и снижение содержания кальция, что приводит к нарушению сократимости гладких мышц и их расслаблению. Действие папаверина гидрохлорида на центральную нервную систему выражено слабо, лишь в больших дозах он оказывает седативный эффект. В больших дозах снижает возбудимость сердечной мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость.

Показания к применению

Спазм периферических сосудов (эндартериит), сосудов головного мозга, стенокардия (в составе комплексной терапии), бронхоспазм, спазм гладкой мус-

кулатуры органов брюшной полости (пилороспазм, спастический колит, холецистит, приступы желчнокаменной болезни), спазм мочевых путей, почечная колика.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, атриовентрикулярная (AV) блокада, глаукома, тяжелая печеночная недостаточность, пожилой возраст (риск развития гипертермии), детский возраст до 1 года.

С осторожностью

Состояние после черепно-мозговой травмы, хроническая почечная недостаточность, недостаточность функции надпочечников, гипотиреоз, гиперплазия предстательной железы, наджелудочковая тахикардия, шоковые состояния.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности и в период грудного вскармливания оправдано только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Ректально, взрослым по 0,02–0,04 г (1-2 свечи) 2–3 раза в сутки.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, частичная или полная AV блокада, желудочковая экстрасистолия, снижение артериального давления (АД), запор, сонливость, повышение активности «печеночных» трансаминаз, эозинофилия.

Проинформируйте лечащего врача о появлении у Вас любых нежелательных или неприятных реакций и ощущений.

Передозировка

Симптомы: диплопия, слабость, снижение АД, сонливость.

Лечение: симптоматическое (поддержание АД).

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы. В комбинации с барбитуратами спазмолитическое дейст-

вие папаверина гидрохлорида усиливается. При совместном применении с трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином сульфатом возможно усиление гипотензивного эффекта.

Особые указания

В период лечения прием алкоголя должен быть исключен. Вазодилатирующее действие снижается при табакокурении.

Сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами отсутствуют.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 0,02 г.

5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 12 до 15° С.

Срок годности

2 года. Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Предприятие-производитель/ организация, принимающая претензии

ОАО «Биохимик», Россия,

430030, г. Саранск, ул. Васенко, 15 А

Тел./факс (8342) 47-36-48, 47-36-78.

Претензии по качеству препарата предъявлять на адрес предприятия-производителя.

Представитель фирмы: **Колодезная Т.С.**

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки
https://protabletky.ru/papaverine/