

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного препарата для медицинского применения  
**Плантекс®**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:** П N012351/01

**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА:** Плантекс®

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА:**

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь для детей

**СОСТАВ:**

1 пакетик (5 г – 1 доза) содержит:

*активные компоненты:* фенхеля плодов экстракт сухой водный – 250,00 мг; эфирное масло фенхеля\* – 2,4 мг (с содержанием не менее 0,5 мг анетола и не менее 0,2 мг фенхона).

*вспомогательные вещества:* акации камедь\* - 12,60 мг, декстроза безводная – 2500,00 мг, лактоза – 2235,00 мг.

\*Эфирное масло фенхеля и акации камедь входят в состав Фенхельного ароматизатора (15 мг/пакетик)

**ОПИСАНИЕ**

Мелкие гранулы светло-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета с запахом фенхеля.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА**

Спазмолитическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: А03АХ

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Плантекс® - лекарственный препарат растительного происхождения.

Плоды фенхеля и эфирное масло фенхеля стимулируют пищеварение, увеличивая секрецию желудочного сока и усиливая перистальтику. Поэтому пища быстрее расщепляется и всасывается. Активные вещества предупреждают скопление газов и способствуют их отхождению, «смягчают спазмы» кишечника.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Плантекс® рекомендуется использовать у детей с 2-х недель жизни и более старшего возраста в качестве профилактического и лечебного средства для устранения

спастических болей в кишечнике при слабых расстройствах пищеварения, а также при переходе с грудного вскармливания на другие виды питания.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- Гиперчувствительность к компонентам препарата;
- синдром нарушенного всасывания галактозы/глюкозы;
- лактазная недостаточность;
- галактоземия.

### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендовано (в связи с отсутствием клинических данных).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Внутрь, после еды, в перерывах между приемами пищи.

*Новорожденные и дети до 1 года:* 1-2 пакетика (5-10 г) в сутки в 2-3 приема;

*Дети от 1 до 4 лет:* 2-3 пакетика (10-15 г) в сутки в 2-3 приема.

Приготовление раствора: высыпать содержимое пакетика в бутылочку или чашку, добавить 100 мл теплой кипяченой воды и размешать до полного растворения гранул.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Возможны аллергические реакции.

### **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Данных о симптомах передозировки нет.

### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Данных о нежелательном взаимодействии с другими лекарственными препаратами нет.

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Для грудных детей использовать только свежеприготовленный раствор. Не добавлять подсластители.

### **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ**

Не применимо.

### **ФОРМА ВЫПУСКА**

5 г гранул для приготовления раствора для приема внутрь для детей в пакетике; по 10 пакетиков вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**СРОК ГОДНОСТИ**

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

Без рецепта.

**СПЕЦИАЛЬНЫ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ  
НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

Не требуются.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Лек д.д.

Веровшкова 57, 1526 Любляна, Словения

*Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:*

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1

Тел. (495) 660-75-09 Факс (495) 660-75-10

Представитель компании



*Никulina E.P.* Никулина Е.П.