

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ  
ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  
СЕПТОЛЕТЕ® Д  
SEPTOLETE® D**

**Регистрационный номер:**

**Торговое (патентованное) название:** Септолете® Д

**Лекарственная форма:** пастилки без сахара

**Состав**

1 пастилка содержит:

*Активные вещества:*

бензалкония хлорид	1 мг
левоментол	1,2 мг
тимол	0,6 мг
мяты перечной масло	1 мг
эвкалипта листьев масло	0,6 мг

*Вспомогательные вещества:* мальтитол жидкий, маннитол, касторовое масло, глицерол, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, безводный, повидон, краситель хинолиновый желтый (E104), титана диоксид (E171), воск эмульсионный, мальтитол.

**Описание**

Круглые, двояковыпуклые пастилки желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство

**Код АТХ:** R02AA20

**Фармакологические свойства**

Пастилки Септолете® Д представляют собой комбинацию антисептического средства из группы четвертичных соединений аммония (бензалкония хлорид) и активных природных веществ (ментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло эвкалипта, тимол), которые увеличивают активность антисептического средства и улучшают его вкус.

Бензалкония хлорид оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а так же фунгицидное действие в отношении *Candida albicans* и некоторых липофильных вирусов.

Ментол и эфирное масло мяты перечной обладают умеренным обезболивающим и дезодорирующим действием. Пастилки облегчают боль при глотании и субъективные ощущения дискомфорта, например «першение». Тимол обладает антисептическим действием, которое усиливает эффективность препарата. Эфирное масло эвкалипта уменьшает секрецию слизи в верхних отделах дыхательных путей и облегчает дыхание.

Препарат Септолете® плюс содержит полиолы (мальтитол и маннитол), не содержит сахара, что позволяет принимать препарат больным сахарным диабетом. Безсахарная среда увеличивает активность антисептического средства. Мальтитол и маннитол метаболизируются бактериями ротовой полости очень медленно и в незначительной степени, поэтому не оказывают повреждающего действия на эмаль зубов.

**Показания к применению**

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

- фарингит, ларингит, тонзиллит;
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

**Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы;
- детский возраст до 4-х лет.

**С осторожностью:** сахарный диабет.

**Беременность и период лактации**

Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать таблетки Септолете® Д только по рекомендации врача. Данные по применению препарата во время беременности и кормления грудью ограничены, поэтому полностью не исключен риск для плода и ребенка.

**Способ применения и дозы**

1 таблетку следует медленно рассасывать в полости рта каждые 2-3 часа. Детям старше 4 лет рекомендуется принимать не более 4 таблеток в день, детям старше 10 лет рекомендуется принимать не более 6 таблеток в день. Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать не более 8 таблеток в день. Таблетки рассасывают до полного растворения.

Не следует принимать таблетки непосредственно перед приемом пищи, во время еды и вместе с молоком.

**Побочное действие**

*Со стороны пищеварительной системы:* в очень редких случаях возможны тошнота, рвота, диарея.

Возможны *аллергические реакции* (у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата).

**Передозировка**

*Симптомы:* тошнота, рвота и диарея (полиолы- мальтитол и маннитол; глицерол), головная боль (глицерол).

*Лечение:* симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Бензалкония хлорид не рекомендуется применять с другими антисептиками, предназначенными для рассасывания в полости рта.

Рекомендуется воздерживаться от одновременного приема Септолете® Д с молоком, т.к. молоко снижает антисептический эффект бензалкония хлорида.

**Особые указания**

Не рекомендуется превышать рекомендованные дозы.

Таблетки Септолете® Д могут применять больные, имеющие противопоказания или ограничения в приеме сахаросодержащих препаратов.

**Больным сахарным диабетом** следует помнить, что каждая таблетка содержит 0,95 г мальтитола. Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, но, поскольку гидролиз и всасывание в желудочно-кишечном тракте происходят медленно, коррекции дозы гипогликемических препаратов не требуется. Энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г или 2,4 ккал/г) существенно меньше, чем у сахарозы.

При более тяжелом течении заболевания, сопровождающимся повышением температуры, головной болью и рвотой, необходимо обратиться к врачу, особенно, если состояние не улучшается в течение 3-х дней от начала терапии.

Таблетки Септолете® Д содержат глицерол, который в высоких дозах может вызвать головную боль и желудочно-кишечные расстройства. Таблетки Септолете® Д также

содержат полиолы (мальтитол, маннитол), которые в высоких дозах могут вызвать диспепсические расстройства, особенно у детей.

Септолете® Д содержит мальтитол; поэтому пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы не следует принимать препарат.

**Влияние на способность управлять автомобилем и другими сложными механизмами:**

нет данных о том, что препарат Септолете® плюс оказывал воздействие на способность управлять автомобилем и работу со сложными механическими средствами.

**Форма выпуска**

Пастилки без сахара.

По 15 пастилок в блистер. 2 блистера в пачку картонную вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:** КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

**По всем вопросам обращаться по адресу Представительства в РФ:**

123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.41

Тел. (495) 739-66-00, факс: (495) 739-66-01

**При расфасовке и/или упаковке на российском предприятии указывается:**

ООО "КРКА-РУС", 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50

Тел.: (495) 994-70-70

Факс: (495) 994-70-78

или


ЗАО «ВЕКТОР-МЕДИКА», 630559 Россия, п. Кольцово Новосибирской обл.,

тел./факс: (383) 363-32-96

Руководитель отдела  
регистрации и сертификации:

Ю.А. Тихонова

КРКА  
Novo mesto



<https://protabletky.ru/septolete-d/>

5 4 2 1 3