

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата

ТераФлю®

(THERAFLU®)

Регистрационный номер –

Торговое название: ТераФлю®

Лекарственная форма Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный).

Описание лекарственной формы. Сыпучий порошок, состоящий из гранул белого и желтого цвета с лимонным запахом. Допускается наличие мягких комков. При растворении содержимого пакетика в 225 мл нагретой до $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ воды образуется непрозрачный раствор желтого цвета с запахом лимона.

Состав. Один пакетик содержит:

активные компоненты: парацетамол (в гранулах) 325 мг, фенирамина малеат 20 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг,

вспомогательные компоненты: сахароза, калия ацесульфам, краситель желтый D&C#10, краситель желтый FD&C#6, мальтодекстрин M100, кремния диоксид, натуральный лимонный ароматизатор WONF Durarome 860.098 TD 10.91, натуральный лимонный ароматизатор Durarome 860.202 TD 09.91, лимонная кислота безводная (мелкогранулированная), натрия цитрат дигидрат, кальция фосфат трехосновный, магния стеарат (растительного происхождения).

Фармакотерапевтическая группа: ОРЗ и “простуды” симптомов средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство+альфа-адреномиметик+H1-гистаминовых рецепторов блокатор)

Код АТХ: N02BE51

Фармакологические свойства: Комбинированный препарат, обладает жаропонижающим, деконgestивным, обезболивающим и противоаллергическим действием.

Показания к применению: Инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп), сопровождающиеся высокой температурой, ознобом и лихорадкой, головной болью, насморком, заложенностью носа, чиханием и болями в мышцах.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания.

Не применять у детей до 12 лет.

С осторожностью назначать при: артериальной гипертензии, сахарном диабете, закрытоугольной глаукоме, тяжелых заболеваниях печени или почек, гиперплазии предстательной железы, дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Способ применения и дозы: Растворить содержимое одного пакетика в 1 стакане кипяченой горячей воды. Употреблять в горячем виде. Можно добавить сахар по вкусу.

Повторную дозу можно принимать через каждые 4 часа (не более 3 доз в течение 24 часов).

ТераФлю® можно применять в любое время суток, но наилучший эффект приносит прием препарата перед сном, на ночь. Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

Побочные эффекты: Возможны аллергические реакции, сонливость, тошнота, эпигастральная боль, сухость во рту, парез аккомодации, задержка мочи, редко: анемия.

Передозировка: Тошнота, рвота, боли в эпигастральной области; гепатотоксическое и нефротоксическое действие, в тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность, энцефалопатия и коматозное состояние.

Следует сделать промывание желудка пострадавшему пациенту, назначить активированный уголь и обратиться к врачу.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами: Рекомендуется воздержаться от приема препарата при приеме ингибиторов моноаминооксидазы. Риск гепатотоксического действия парацетамола повышается при одновременном назначении барбитуратов, дифенина, карбамазепина, рифампицина, зидовудина и других индукторов микросомальных ферментов печени.

Особые указания: Во избежание токсического поражения печени прием препарата не следует сочетать с применением алкогольных напитков.

Во время лечения не рекомендуется управлять автомобилем или другими механизмами, требующими концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.

Не следует использовать препарат из поврежденных пакетиков.

Форма выпуска:

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный) 15,2 г.

По 15,2 г препарата в пакетик из комбинированного материала (полиэтилен, алюминиевая фольга, полиэтилен/бумага). По 6, 8, 10 или 12 пакетиков в картонной пачке. Инструкция по применению наносится на пакетик.

Условия хранения: При температуре не выше 25° С в сухом защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель: Новартис Консьюмер Хелс СА., Швейцария,

произведено: Патеон Витби Инк., Канада

Адрес: 111 Консьюмер Драйв, Витби, Онтарио, Канада L1N 5Z5

(Novartis Consumer Health SA., Switzerland, manufactured: Patheon Whitby Inc., Canada.)

Adress: 111 Consumers Drive, Whitby, Ontario, Canada L1N 5Z5

Представительство в Москве: 123104 Москва, Б. Палашевский переулок, 15,

тел. (495) 969 - 21- 65, факс(495) 969 - 21- 66, e-mail: consumerhealth@novartis.ru

Директор ИДКЭЛС, профессор



Представитель фирмы

В.В.Чельцов

Е.Д.Безносюк

Больше информации об этом лекарстве на ПроТаблетки

<https://protabletky.ru/terafu>