

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ВАЛИДОЛ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ВАЛИДОЛ

Лекарственная форма: Капсулы подъязычные

Состав

1 капсула содержит левоментола раствор в ментил изовалерате - 50/100 мг, состав оболочки в пересчете на абсолютно сухое вещество: желатин медицинский - 17/22 мг, глицерол (глицерин) - 5/8 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,14/0,18 мг

Описание

Капсулы шарообразной формы, от бесцветного до светло-желтого цвета, заполнены прозрачной маслянистой жидкостью с запахом ментола

Фармакотерапевтическая группа

Коронародилатирующее средство рефлекторного действия

Код АТХ

C01EX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и высвобождение энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, кининов (засчет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формирования болевых ощущений.

Фармакокинетика

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. После всасывания биотрансформируется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуроноидов.

Показания к применению

Функциональные кардиалгии, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Валидол назначают под язык. Капсулу следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 капсуле 2-3 раза в день. Суточная кратность и продолжительность приема валидола определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или, когда у отдельных больных в



ближайшие 5 мин после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Побочное действие

При длительном приеме валидола могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение вместе с нейротропными препаратами угнетающего типа действия усиливает угнетающее действие последних на ЦНС, способствует наступлению сна и его более глубокому течению.

Одновременное применение Валидола с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Передозировка

При передозировке препарата могут наблюдаться: головная боль, тошнота, возбужденное состояние, нарушение деятельности сердца, снижение артериального давления, угнетение ЦНС. В случае возникновения клинической картины передозировки необходимо отменить препарат и проводить симптоматическую терапию.

Форма выпуска

Капсулы подъязычные 50 мг и 100 мг.

По 20 капсул в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

ООО «Люми», РФ, 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин двор тер, корпус 42, т/ф (812)327-78-76.

Адрес производства: 620032, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, т/ф (343)261-10-38.

Претензии направлять в адрес производителя.

И.О. директора ИДКЭЛС

Генеральный директор
ООО "Люми"



А.Н. Васильев

А.Е. Федотов



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЛСР-006668/08

Инструкция по медицинскому применению
Валидол

капсулы подъязычные 50 мг и 100 мг

ООО "Люми", Россия

Изменение № 1

Срок введения изменения с «21» 07 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Форма выпуска Капсулы подъязычные 50 мг и 100 мг. По 20 капсул в контурной ячейковой упаковке. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p>	<p>Форма выпуска Капсулы подъязычные 50 мг и 100 мг. По 20 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1,2,4,6,10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона или герметично запаянный полиэтиленовый пакет из светонепроницаемой полиэтиленовой пленки, или пакет из материала комбинированного на бумажной и картонной основе с полиэтиленовым покрытием, или материала комбинированного «Буфлен». По 5,10,20,50,100,200,400,500,600 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению в герметично запаянный полиэтиленовый пакет из светонепроницаемой полиэтиленовой пленки. Допускается нанесение полного текста инструкции по применению на пачке, пакете. Полиэтиленовые пакеты помещают в коробку картонную. Групповая упаковка и транспортная тара в соответствии с ГОСТ 17768-90.</p>
<p>Производитель ООО «Люми», 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин двор тер, корпус 42. Т/ф (812) 327-78-76. Адрес производства 620032, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. Т/ф (343) 261-10-38.</p>	<p>Производитель ООО «Люми», 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин двор тер, корпус 42. Т/ф (812) 327-78-76. Адрес производства 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. Т/ф (343) 261-10-38.</p>

Генеральный директор ООО "Люми"

Больше информации об этом лекарстве на ProTabletky

<https://protabletky.ru/validol/>

А.Е. Федотов

